

Comprimés de PTU^{MC} de 50 mg



Propylthiouracile

Information sur le médicament à l'intention du consommateur

Que contient ce feuillet?

Ce feuillet répond à quelques questions courantes sur le PTU. Il ne contient toutefois pas tous les renseignements disponibles et ne remplace pas un entretien avec votre médecin ou votre pharmacien.

Tous les médicaments présentent des risques et des bienfaits. Votre médecin a pesé les risques que vous courez en prenant du PTU par rapport aux bienfaits que le médicament vous réserve.

Si vous avez des inquiétudes quant à la prise de ce médicament, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce feuillet doit être conservé avec le médicament.

Il est possible que vous deviez le lire à nouveau.

À quelle fin le PTU est-il utilisé?

Ce médicament est utilisé pour traiter l'hyperactivité de la glande thyroïde (ou l'hyperthyroïdie). Une glande thyroïdienne hyperactive produit trop d'hormones thyroïdiennes. Ce médicament peut également être utilisé pour traiter les symptômes de l'hyperthyroïdie avant une intervention chirurgicale ou une thérapie à l'iode radioactif.

Ce médicament appartient à un groupe de médicaments appelés médicaments antithyroïdiens.

Ce médicament agit en empêchant la formation de l'hormone thyroïdienne. Ce médicament peut prendre jusqu'à une semaine pour réduire les symptômes de l'hyperthyroïdie.

Parlez à votre médecin si vous avez des questions sur les raisons pour lesquelles ce médicament vous a été prescrit.

Il est possible que votre médecin l'ait prescrit pour une autre raison.

Avant de prendre du PTU

Quand vous ne devez pas le prendre

Ne prenez pas du PTU si vous avez :

- une allergie à tout médicament contenant du propylthiouracile;
- une allergie à un des ingrédients indiqués à la fin de ce feuillet;
- une allergie de tout autre médicament similaire (dérivés du thioamide).

Certains des symptômes d'une réaction allergique, dont:

- de l'essoufflement;
- une respiration sifflante ou de la difficulté à respirer;
- un gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou d'autres parties du corps;
- une éruption cutanée, des démangeaisons ou de l'urticaire sur la peau.

N'allaites pas si vous prenez ce médicament.

L'ingrédient actif du PTU passe dans le lait maternel et il est possible que votre bébé en soit affecté.

Ne prenez pas ce médicament après la date de péremption imprimée sur l'emballage ou encore si l'emballage est déchiré ou présente des signes d'altération.

Si le médicament est périmé ou l'emballage est endommagé, retournez-le à votre pharmacien pour qu'il l'élimine.

Si vous ne savez pas si vous devez commencer à prendre ce médicament, parlez-en à votre médecin.

Avant de commencer à le prendre

Informez votre médecin si vous êtes allergique à d'autres médicaments, aliments, agents de conservation ou colorants.

Informez votre médecin si vous avez ou avez eu de l'asthme.

Informez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous prévoyez de le devenir.

Votre médecin peut discuter avec vous des risques et des bienfaits de ce médicament.

Si vous n'avez pas parlé à votre médecin d'un des éléments ci-dessus, dites-le-lui avant de commencer à prendre du PTU.

Si vous prenez d'autres médicaments

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments, y compris ceux que vous vous procurez sans ordonnance de votre pharmacie, supermarché, magasin d'aliments naturels, naturopathe ou herboriste.

Certains médicaments et le PTU peuvent interférer entre eux. Il s'agit notamment de :

- les médicaments utilisés pour prévenir les caillots sanguins ou éclaircir le sang (par exemple l'héparine, la warfarine, l'aspirine);
- tout médicament qui a un effet secondaire appelé agranulocytose, c'est-à-dire un manque de globules blancs. Il s'agit notamment :
 - d'antibiotiques sulfonamides;
 - la clozapine, un médicament utilisé pour traiter la schizophrénie;
 - la spironolactone, un médicament utilisé pour traiter l'hypertension.

Parlez à votre médecin pour en savoir plus sur les médicaments qui provoquent cet effet secondaire.

Ces médicaments peuvent être affectés par le PTU ou peuvent affecter son efficacité. Il est possible que vous ayez besoin de quantités différentes de vos médicaments ou encore de prendre des médicaments différents.

Votre médecin et votre pharmacien disposent de plus d'information sur les médicaments à prendre avec précaution ou à éviter pendant la prise de PTU.

Comment prendre le PTU

Suivez attentivement toutes les directives qui vous sont données par votre médecin ou votre pharmacien.

Elles peuvent différer de l'information présentée dans ce dépliant.

Si vous ne comprenez pas les directives figurant sur le flacon, demandez l'aide de votre médecin ou de votre pharmacien.

Combien prendre

Votre médecin vous indiquera combien de comprimés prendre et quand les prendre chaque jour. Cela dépendra de votre état, des autres médicaments que vous prenez et de votre réponse au traitement avec le PTU.

Une fois que votre état se sera amélioré, il est possible que votre médecin vous prescrive une dose plus faible à long terme pour maintenir votre état.

Comment le prendre

Avalez les comprimés entiers avec un grand verre d'eau.

Quand le prendre

Le PTU doit être pris chaque jour à des doses égales et à intervalles réguliers au cours de la journée. Si votre médecin vous prescrit deux doses par jour, vous devez prendre chaque dose à 12 heures d'intervalle. Si votre médecin vous prescrit quatre doses par jour, vous prendrez chaque dose à 6 heures d'intervalle.

Prenez votre médicament à peu près à la même heure chaque jour.

Le fait de le prendre chaque jour à la même heure aura le meilleur effet. Cela vous aidera également à vous souvenir du moment où vous devez le prendre.

Pendant combien de temps le prendre

Continuez de prendre votre médicament aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit.

Ce médicament aide à contrôler votre état, mais ne le guérit pas. Il est important de continuer de prendre votre médicament même si vous vous sentez bien.

Si vous oubliez de le prendre

S'il faut moins de 6 heures pour une dose biquotidienne ou 3 heures pour une dose quadriquotidienne avant votre prochaine dose, sautez la dose que vous avez manquée et prenez votre prochaine dose au moment prévu.

Sinon, prenez-le dès que vous vous en souvenez, puis recommencez à prendre vos médicaments comme vous le feriez normalement.

Ne prenez pas une double dose pour compenser la dose que vous avez manquée.

Cela peut augmenter le risque de souffrir d'un effet secondaire indésirable.

Si vous ne savez pas quoi faire, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez du mal à vous souvenir de prendre vos médicaments, demandez conseil à votre pharmacien.

Si vous en prenez trop (surdose)

Téléphonez immédiatement à votre médecin ou au centre d'information sur les poisons en composant le 13 11 26 (Australie) pour obtenir des conseils ou encore rendez-vous à l'urgence de l'hôpital le plus proche si vous pensez que vous ou quelqu'un d'autre avez pu prendre trop de PTU. Faites-le même s'il n'y a aucun signe de gêne ou d'empoisonnement. Vous pourriez avoir besoin de soins médicaux urgents.

Les symptômes d'une surdose peuvent inclure :

- des symptômes d'agranulocytose :
 - aphtes buccaux;
 - maux de gorge;
 - infections fréquentes (fièvre, frissons);
 - maux de tête, fatigue et léthargie;
- des symptômes d'hypothyroïdie :
 - fatigue, léthargie;
 - faiblesse musculaire, crampes;
 - sensation de froid;
 - rythme cardiaque lent;
 - peau sèche, bouffie, squameuse;
 - perte de cheveux;
 - voix profonde et rauque;
 - prise de poids inhabituelle;
 - changement des périodes menstruelles;
 - apathie;
 - constipation;
 - maux de tête.

Pendant que vous prenez du PTU

Ce que vous devez faire

Si vous êtes sur le point de commencer à prendre un nouveau médicament, rappelez à votre médecin et à votre pharmacien que vous prenez du PTU.

Informez tous vos autres médecins, dentistes et pharmaciens traitants que vous prenez ce médicament.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez le chirurgien ou l'anesthésiste que vous prenez ce médicament.

Il peut avoir un effet sur l'efficacité d'autres médicaments utilisés pendant l'intervention chirurgicale.

Si vous devenez enceinte pendant que vous prenez ce médicament, informez-en immédiatement votre médecin.

Si vous êtes sur le point de passer des examens sanguins, informez votre médecin que vous prenez ce médicament.

Il peut interférer avec les résultats de certains tests.

Respectez tous vos rendez-vous médicaux afin que vos progrès puissent être contrôlés.

Votre médecin peut effectuer de temps à autre certains tests tels que des numérations globulaires complètes, des tests de la fonction thyroïdienne à intervalles réguliers et des tests de la fonction hépatique pour s'assurer de l'efficacité du médicament et pour prévenir les effets secondaires indésirables.

Ce que vous ne devez pas faire

Ne prenez pas de PTU pour traiter d'autres problèmes sans l'approbation de votre médecin.

Ne donnez pas vos médicaments à d'autres personnes, même si elles sont dans la même situation que vous.

N'arrêtez pas de prendre votre médicament et n'en diminuez pas la dose sans consulter votre médecin.

Si vous arrêtez soudainement de le prendre, votre état risque de s'aggraver.

Précautions à prendre

Faites attention en conduisant ou en faisant fonctionner de la machinerie jusqu'à ce que vous sachiez comment le PTU vous affecte.

Ce médicament peut provoquer des étourdissements et/ou de la fatigue chez certaines personnes. Si vous présentez un de ces symptômes, ne conduisez pas, n'utilisez pas de machinerie et ne faites rien d'autre qui pourrait être dangereux. Les enfants doivent être prudents lorsqu'ils font du vélo ou grimpent dans des arbres.

Si vous avez des vertiges, des étourdissements ou des évanouissements en sortant du lit ou en vous levant, levez-vous lentement.

Se lever lentement, en particulier lorsque vous vous levez du lit ou d'une chaise, aidera votre corps à s'habituer au changement de position et à la pression sanguine. Si ce problème persiste ou s'aggrave, parlez-en à votre médecin.

Effets secondaires

Si vous ne vous sentez pas bien pendant que vous prenez du PTU, informez-en votre médecin ou votre pharmacien dès que possible.

Ce médicament aide la plupart des personnes atteintes d'hyperthyroïdie, mais il peut avoir des effets secondaires indésirables chez quelques personnes. Tous les médicaments peuvent avoir des effets secondaires. Ils sont parfois graves, mais la plupart du temps ils ne le sont pas. Il est possible que vous ayez besoin de soins médicaux si vous ressentez certains de ces effets secondaires.

Si vous êtes une femme âgée de moins de 30 ans, vous courez peut-être plus de risques d'avoir certains effets secondaires.

Les listes d'effets secondaires suivantes ne doivent pas vous alarmer. Il se peut que vous n'en éprouviez aucun.

Posez toute question que vous pouvez avoir à votre médecin ou votre pharmacien.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous remarquez l'un des symptômes suivants et qu'il vous inquiète (ceux qui indiquent la nécessité de soins médicaux uniquement s'ils persistent ou sont gênants) :

- démangeaisons
- étourdissements
- douleurs articulaires
- perte de goût
- nausées, vomissements, douleurs à l'estomac
- engourdissement ou picotement des doigts, des orteils ou du visage
- rash cutané
- changement de couleur de la peau ou des cheveux, perte de cheveux
- yeux rouges, larmoyants et douloureux

La liste ci-dessus comprend les effets secondaires de vos médicaments qui sont généralement légers et de courte durée.

Informez votre médecin dès que possible si vous remarquez les symptômes suivants de thyrotoxicose (excès d'hormones thyroïdiennes) :

- diarrhées
- fièvre
- irritabilité, apathie, faiblesse
- rythme cardiaque rapide ou irrégulier
- vomissements

La liste ci-dessus comprend des effets secondaires, ce qui pourrait signifier que le médicament ne fonctionne pas correctement.

Informez votre médecin dès que possible si vous remarquez l'un des symptômes suivants :

- jaunissement des yeux et de la peau
- perte d'ouïe
- glandes gonflées
- saignements ou ecchymoses inhabituels
- augmentation ou diminution de la miction
- maux de dos
- gonflement des pieds ou de la partie inférieure des jambes
- symptômes de vascularite :
 - douleurs articulaires
 - fièvre
 - éruptions cutanées ou boutons rouges sur la peau
 - respiration sifflante ou difficulté à respirer
 - difficulté à uriner
- urticaire
- gêne abdominale supérieure
- sensation de picotement ou de piquûre

La liste ci-dessus comprend des effets secondaires graves qui peuvent nécessiter une attention médicale. Les effets secondaires graves sont rares.

Si vous présentez l'un des symptômes suivants, prévenez immédiatement votre médecin ou rendez-vous à l'urgence de l'hôpital le plus proche :

- symptômes d'agranulocytose, de granulocytopenie et de leucopénie (manque de globules blancs) :
 - aphtes buccaux
 - mal de gorge
 - infections fréquentes (fièvre, frissons)
 - maux de tête, fatigue et léthargie
- symptômes de thrombocytopenie :
 - saignement ou ecchymoses plus facilement que la normale

- symptômes d'hypothyroïdisme :
 - fatigue, léthargie
 - faiblesse musculaire, crampes
 - sensation de froid
 - rythme cardiaque lent
 - peau sèche, bouffie, squameuse
 - perte de cheveux
 - voix profonde et rauque
 - prise de poids inhabituelle
 - changement des périodes menstruelles;
 - apathie
 - constipation
 - maux de tête
- symptômes de réactions d'hypersensibilité : réactions cutanées graves et perte de peau (syndrome de Stevens Johnson et nécrolyse épidermique toxique)
- symptômes d'hépatotoxicité :
 - inconfort dans la partie supérieure de l'estomac
 - fièvre
 - nausées et vomissements accompagnés de perte de poids
- maladie rénale
- desquamation ou écaillage important de la peau
- gonflement des poumons entraînant des difficultés respiratoires
- éruptions cutanées accompagnées de boutons rouges

La liste ci-dessus comprend des effets secondaires très graves. Il est possible que vous ayez besoin de soins médicaux urgents ou d'une hospitalisation. Ces effets secondaires sont très rares.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous remarquez quelque chose qui vous rend malade.

Certaines personnes peuvent aussi vivre d'autres effets secondaires non énumérés ci-dessus.

Certains de ces effets secondaires ne peuvent être détectés que lorsque votre médecin effectue des tests de temps en temps pour vérifier votre progrès.

Après l'utilisation de PTU

Rangement

Gardez les comprimés dans le flacon jusqu'au moment de les prendre.

Si vous retirez des comprimés du flacon, ils pourraient de ne pas bien se conserver.

Conservez vos comprimés dans un endroit frais et sec où la température reste inférieure à 30 °C.

Ne conservez pas de PTU ou tout autre médicament dans la salle de bain ou près d'un lavabo. Ne le laissez pas sur un rebord de fenêtre ou dans la voiture.

La chaleur et l'humidité peuvent détruire certains médicaments.

Gardez le médicament hors de portée d'enfants.

Une armoire fermée à clé, se trouvant à au moins un mètre et demi du sol, est un bon endroit pour garder des médicaments.

Élimination

Si votre médecin vous dit d'arrêter de prendre ce médicament ou si la date de péremption du médicament est passée, demandez à votre pharmacien ce que vous devez faire des médicaments restants.

Description du produit

À quoi il ressemble

Les comprimés de PTU sont ronds, blancs et biconvexes. Une face est gravée « PRESTAB » tandis que rien n'est gravé sur l'autre face.

Les comprimés de PTU sont vendus dans un flacon en verre ambré contenant 100 comprimés.

Ingrédients

Chaque comprimé de PTU contient 50 mg de l'ingrédient actif propylthiouracile.

Autres ingrédients :

- lactose monohydraté
- amidon de maïs
- povidone
- alcool méthylique (éliminé pendant le processus)
- laurylsulfate de sodium
- stéarate de magnésium

Ce médicament ne contient ni saccharose, ni gluten, ni colorants de tartrazine, ni agents de conservation.

Fournisseur

En Australie, le PTU est vendu par :

Phebra Pty Ltd
19 Orion Road, Lane Cove West,
NSW 2066, Australie
Téléphone : 1800 720 020

Comprimés de PTU™ 50 mg
100 comprimés par flacon

AUST R 13319

Code de produit de Phebra : TAB001

Date de la plus récente modification :
Février 2020

PTU, Phebra et le symbole Phi sont des marques de commerce de Phebra Pty Ltd., 19 Orion Road, Lane Cove West, NSW 2066, Australie.